

シテ赤松が生エ下草ハナク赤土ヲ裸出シテ居ル、燥原ニ近イモノト思ハレルガ此處ニ發生スル *Cladonia* ノ類ハ中部歐洲ノ不毛ナル原野、矮樹林等ニ出現スル種類ニ酷似シ *Cladonia rangiferina* f. *tenuior*, *Cl. sylvatica* f. *decumbens*, *Cl. aggregata*, *Cl. crispata*, *Cl. squamosa*, *Cl. verticillata*, *Cl. subcariosa*, *Cl. strepsilis* 等ガアル、又土田村ノ遊覽船發着所附近ノ山手デけつとごけ (*Dictyonema sericeum*) ノ一薄片ヲ採ツタ蓋シ從來ノ最北限ノ產地遠州秋葉山 (本誌第3巻150頁) ヲ北ニ越ユルコト約50軒程デアル。

(朝比奈泰彦)


○かぢのきノ葉ノ著キ方

かぢのき (*Broussonetia papyrifera* VENT.) ノ葉ノ着キ方ハドウナツテ居ルカ? ト問ハレタラ何人モ言下ニ互生ト答ヘルデアラウ。シカシ其レハ公ノ場合ノコトデアツテ對生ノコトモアル。一般ニ莖ノ頂部デハ對生デ、生長スルニ從ヒ互生ニナル。中ニハ互生ト對生トヲ交互ニヤツテ居ルコトモアル。余ハソソナ標本ヲ持ツテ居ル。あさハ大體幼本ガ對生デ生長スルト互生ニナルコトハ餘リニモ名高イガ、かぢのきハ正ニ其レト反對デアル。別ノ科デハアルガべんけいさう科ノ小草こもちまんねんぐさナドモあさ式デアルコトモ知レ渡ツタ事實デアル、對生ダノ互生ダノ餘計ナコトヲ云フカラコンナ場合ニ困ルノデアル。葉序ハ2/5ヲ示シナドト威張ルノハ壇ノ上丈ケデ云フコトダ。

(久内清孝)

○ひめがまノ奇態

ひめがま (*Typha angustata* BORY et CHAUB.) ノ花穂ハ雄穂ト雌穂トノ間ニ間隔ヲ有スルモノダガ本品ハ雌穂ガ二段ニナリタル爲メ一見異様ヲ呈シテ居ルガ、タダ夫レ丈ノ事デアル依ツテひめがまノ一奇態トシテ報告シテオク。昨年ノ夏千葉縣ノ八積附近ノ池沼中デひめがまノ常態ノモノニ伍シテタダ一本見附カツタモノデア



ひめがま雌花穂ノ中断